岐阜大学機関リポジトリ

Gifu University Institutional Repository

Identification and Characterization of a Novel Human-specific Carbohydrate Epitope in Milk Proteins

メタデータ	言語: English 出版者: 公開日: 2008-02-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 楊, 山明 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12099/2557

氏名（国籍）	楊山明（中国（台湾））
学位の種類	博士（農学）
学位記番号	農博甲第216号
学位授与年月日	平成13年3月13日
学位授与の要件	学位規則第4条第1項該当
研究科及び専攻	連合農学研究科 生物資源科学専攻
研究指導を受けた大学	岐阜大学
学位論文題目	Identification and Characterization of a Novel Human-specific Carbohydrate Epitope in Milk Proteins
審査委員	主査 岐阜大学教授 金丸義敬 副査 岐阜大学教授 渡邊乾二 副査 信州大学教授 大谷元 副査 静岡大学教授 碓氷泰市 副査 岐阜大学助教授 長岡利

論文の内容の要旨

乳の複合糖質の多様な役割を明らかにするためには、それらの成分の化学的特性や生理作用及び機能発揮のメカニズムを解明することが不可欠である。さまざまな微生物の標的細胞への吸着をブロックしたり、細胞のがん化と関連するなど、多様な生理機能と関連することが明らかにされつつある人乳糖タンパク質の MUC1 抗原に対して作製されたモノクローナル抗体の一つ 1CF11 抗体が MUC1 抗原ばかりでなく多様な人乳糖タンパク質を特異的に認識するという興味深い性質を示したことから、本研究はその抗体が認識する抗原決定基（1CF11 エピトープ）の特性をさまざまな点から検討することを目的としたものである。

実験ではまず各種動物の乳、唾液、血液などに対する 1CF11 抗体の反応性を調べ、人乳やヒ唾液中の分泌液に強い反応性が認められること、人乳の分泌型免疫グロブリン A（SigA）のサブユニットでは H 鎖には反応がなく SC にのみ反応が見られることを明らかにした。さらに、人乳 lactoferrin（Lf）を用いて、反応性の消失が過塩素酸処理や穏和なアルカリ処理によってのみ生じること、また、Lf の断片化で得られた 1CF11 エピトープ含有フラグメントの分析から、このエピトープが新規の O 型糖鎖を構成する可能性を示唆する結果を得た。

次に、人乳の精製 Lf を用いた実験から、SDS-PAGE で移動度の異なる二種の成分の存在を認め、CBB 染色では主要成分（Lf-a）と微量成分（Lf-b）として現れるそれら二種の Lf 成分が 1CF11 抗体に対してはほとんど同じ反応性を示すことを明らかにした。Lf のトリプシン消化物による生じる主要フラグメントは分子量 51,000 と 39,000 の二種であるが、1CF11 との反応性では分子量 54,000 と 39,000 のバンドが強く染色されることから、二種

の Lf は 1CF11 エピトープの発現量の異なる二種の C-ロブに起因することを示唆した。

人乳中の糖タンパク質の中で分子量 135,000 の成分 (135K) がきわめて強い 1CF11 抗体との反応性を示すことから、種々のコマトグラフィーを用いてこの成分を精製し、これが人乳胆汁酸刺激パーゼ (BSSL) であることを明らかにした。BSSL は Lf と比較して 1/1000 の濃度で同じ ELISA 反応性を示した。1CF11 との反応性に関する両者の共通性と相違とを同時に説明するいかなる糖鎖構造もこれまで報告されていないことから、1CF11 エピトープが新規の糖鎖構造と関連することが示唆されることを示した。

最後に、ヒト及びサルを含む種々の動物個体から得た多数の唾液を用いて 1CF11 エピトープの反応性を分析し、ヒト及び旧世界サルには本エピトープが認められ、その他の動物では発現がないことを示す結果を得た。

以上の研究結果は、現在一般的に受け入れられている哺乳動物糖タンパク質の糖鎖構造の基本である N 型糖鎖や O 型糖鎖とは異なる構造の新規糖鎖が存在している可能性を示唆しており、また、それらがヒトやヒトに近縁の高等霊長動物に特異的に発現されているというきわめて新しい知見をもたらした。さらに、それらが人乳や唾液といったヒトの分泌液中のさまざまな糖タンパク質に強く発現されていることから、ヒトが経口的に摂取する成分としてユニークな生理機能と結びつく可能性も示唆するものである。よって審査委員会は全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合農学研究科の学位論文として十分価値あるものと認めた。

審 査 結 果 の 要 旨

人乳は乳児の成長に重要な意味を持っている。乳中に見られる遊離オリゴ糖や複合糖質の種類や量の豊富さは人乳の特質の一つであることが知られているが、その意義については必ずしも理解されているわけではない。乳の複合糖質の多様な役割を明らかにするためには、それらの成分の化学的特性や生理作用及び機能発揮のメカニズムを解明することが不可欠である。さまざまな微生物の標的細胞への吸着をブロックする働きを示すこと、あるいは、細胞のがん化と密接に関連するなど、多様な生理機能を持つことが明らかにされつつある人乳糖タンパク質の一つの MUC1 抗原に対して作製されたモノクローナル抗体の一つ 1CF11 抗体が MUC1 抗原ばかりでなくさまざまな人乳糖タンパク質を特異的に認識するという興味深い性質を示したことから、本研究はその抗体が認識するエピトープ (1CF11 エピトープ) の特性をさまざまな点から明らかにすることを目的としたものである。

実験ではまず各種動物の乳、唾液、血液などを用いて 1CF11 の反応性を調べ、人乳やヒト唾液などヒトの分泌液に強い反応性が認められること、人乳の分泌型免疫グロブリン A (SigA) のサブユニットの H 鎖には反応がなく SC にのみ反応が見られ、ヒト血清の非反応性と一致することを明らかにした。さらに、人乳 lactoferrin (Lf) を用いて、反応性の消失が過ヨウ素酸処理や穏和なアルカリ処理のみによって生じること、また、Lf の断片化で得られた 1CF11 エピトープ含有フラグメントの分析から、このエピトープが新規の O 型糖鎖を構成している可能性を示唆する結果を得た (これらの結果は "A Monoclonal Antibody That Recognizes a Common Carbohydrate Epitope Shared by Various Glycoproteins in Human Secretions" として *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, 249, 618-623, 1998 にまとめ

られている。)

人乳の精製 Lf を用いた実験から、SDS-PAGE で移動度の異なる二種の成分の存在を認め、CBB 染色では主要成分 (Lf-a) と微量成分 (Lf-b) として現れるそれら二種の Lf 成分が 1CF11 抗体に対してはほとんど同じ反応性を示すことを明らかにした。Lf のトリプシン消化物による生じる主要フラグメントは分子量 51,000 と 39,000 の二種であるが、1CF11 との反応性では分子量 54,000 と 39,000 のバンドが強く染色され、二種の Lf の存在が 1CF11 エピトプの発現量の異なる C-ローブを持つことに起因すると考えられることを示した。(これらの結果は "Identification of two molecular species in human milk-derived lactoferrin" として *Lactoferrin: Structure, Function and Applications* (K. Shimazaki et al., eds.), Elsevier Science B. V., pp. 17-25, 2000 にまとめられている。)

人乳中の糖タンパク質の中で分子量 135,000 の成分 (135K) がきわめて強い 1CF11 抗体との反応性を示すことから、種々のクロマトグラフィーを用いてこの成分を精製し、これが人乳胆汁酸刺激リパーゼ (BSSL) であることを明らかにした。BSSL は Lf と比較して 1/1000 の濃度で同じ ELISA 反応性を示した。1CF11 との反応性に関する両者の共通性と相違とを同時に説明するいかなる糖鎖構造もこれまで報告されていないことから、1CF11 エピトプが新規の糖鎖構造と関連することが示唆されることを示した。(これらの結果は、"Human milk bile-salt-stimulated lipase is extremely reactive with the monoclonal antibody 1CF11 that recognizes a human-specific carbohydrate antigen" として *Biosci. Biotech. Biochem.*: 65 (4), 2001 (in press) にまとめられている。)

最後に、ヒ及びサルを含む種々の動物個体から得た多数の唾液を用いて 1CF11 エピトプの反応性を分析し、ヒ及び旧世界サルには本エピトプが認められ、その他の動物では発現がないことを示唆する結果を得た。(この結果は、"Unique occurrence of the 1CF11 carbohydrate epitope in primate saliva" として *Biosci. Biotech. Biochem.*: 65 (3), 2001 (in press) にまとめられている。)

以上の研究結果は、現在一般的に受け入れられている哺乳動物タンパク質の糖鎖構造の基本である N 型糖鎖や O 型糖鎖とは異なる構造の新規糖鎖が存在している可能性を示唆しており、また、それらがヒやヒに近縁の高等霊長動物に特異的に発現されているというきわめて新しい知見をもたらした。さらに、それらが人乳や唾液といったヒの分泌液中のさまざまな糖タンパク質に強く発現されていることから、ヒが経口的に摂取する成分としてユニークな生理機能と結びつく可能性も示唆するものである。よって審査委員会は全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合農学研究科の学位論文として十分価値あるものと認めた。